

# ¡Ayude a su mascota a sanar!

durante los próximos 7 a 10 días



©2023 ASPCA\*. Todos los derechos reservados.



## ¡Sin lamer!

Lamer o morder la incisión puede provocar una infección.

## Mantenga la incisión seca\*

El agua afecta al pegamento quirúrgico y abre la incisión, provocando una infección.



## Revisar la incisión

Lo que ves hoy es normal. Revise dos veces al día si hay enrojecimiento, hinchazón o secreción.

(El pequeño tatuaje verde indica que se esterilizó o se castró.)

## Las incisiones en los machos

Es normal ver hinchazón y secreción roja durante unos días en el proceso de curación.



## Separe los animales

Mantenga a las hembras alejadas de los machos sin castrar.



## Restringir la actividad

El descanso en el interior le da tiempo al tejido para sanar y ayuda a que la incisión se mantenga cerrada.

(¡Sin correr, brincar o jugar!)

## Alimentar con una dieta sencilla

No le dé a su mascota comida chatarra, golosinas para animales, sobras ni leche.



## ¡Sin medicación humana!

Es peligroso y puede ser fatal. Su mascota ya recibió analgésicos de acción prolongada.



Haremos todos los esfuerzos razonables para tratar en nuestra clínica, a un costo mínimo, cualquier complicación posoperatoria que resulte directamente de la cirugía, si se siguen estas instrucciones fielmente. Su veterinario habitual debe tratar las enfermedades o lesiones que no resulten directamente de la cirugía.

## Comuníquese con nosotros de inmediato si nota:

Encías pálidas; depresión; problemas para caminar; pérdida de apetito o disminución de la toma de agua; vómitos; diarrea; secreción o sangrado en la incisión; dificultad para orinar o defecar; dificultades para respirar.



SPAY  
NEUTER  
SOCIETY

(469)  
240-  
5130

L-J 8AM-4PM  
V 8AM-12PM