

¡AYUDE A SU MASCOTA A SANAR! DURANTE LOS PRÓXIMOS 7 A 10 DÍAS



SPAY
NEUTER
SOCIETY

©2025 ASPCA®. Todos los derechos reservados.



¡SIN LAMER!

Lamer o morder la incisión puede provocar una infección.

MANTENGA LA INCISIÓN SECA

El agua afecta al pegamento quirúrgico y abre la incisión, provocando una infección.



REVISAR LA INCISIÓN

Lo que ves hoy es normal. Revise dos veces al día si hay enrojecimiento, hinchazón o secreción.

(El pequeño tatuaje verde indica que se esterilizó o se castró.)

LAS INCISIONES EN LOS MACHOS



Se localizan justo enfrente del escroto.

SEPRE LOS ANIMALES

Mantenga a las hembras alejadas de los machos sin castrar.

RESTRINGIR LA ACTIVIDAD

El descanso en el interior le da tiempo al tejido para sanar y ayuda a que la incisión se mantenga cerrada. (¡Sin correr, brincar o jugar!)

ALIMENTAR CON UNA DIETA SENCILLA

No le dé a su mascota comida chatarra, golosinas para animales, sobras ni leche.



¡SIN MEDICACIÓN HUMANA!

Es peligroso y pueda ser fatal. Su mascota ya recibió analgésicos de acción prolongada.



Haremos todos los esfuerzos razonables para tratar en nuestra clínica, a un costo mínimo, cualquier complicación posoperatoria que resulte directamente de la cirugía, si se siguen estas instrucciones fielmente. Su veterinario habitual debe tratar las enfermedades o lesiones que no resulten directamente de la cirugía.

(469)240-5130 **Monday - Thursday 7:30AM - 4:30PM**

Comuníquese con nosotros de inmediato si nota encías pálidas; depresión; problemas para caminar; pérdida de apetito o disminución de la toma de agua; vómitos; diarrea; secreción o sangrado en la incisión; dificultad para orinar o defecar; dificultades para respirar.

¡Mira nuestro vídeo!

